

Tabla de dosificación de acetaminofén e ibuprofeno

Se basa en el peso del niño. No medir con cucharaditas. Use siempre la jeringa, cuchara o taza medidora que viene en la caja. Use esta tabla sólo como una guía. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Acetaminophen (Tylenol®)

Se puede dar cada 4 a 6 horas. No dar más de 5 dosis en 24 horas.
No dar a bebés menores de 2 meses.

Peso (en libras)	Suspensión líquida para bebés	Suspensión líquida para niños	Tableta masticable suave para niños	Tableta masticable para menores	Dosis regular en tableta para adultos
	160 mg/5 mL	160 mg/5 mL	80 mg cada una	160 mg cada una	325 mg cada una
6 to 11	1.25 mL				
12 to 17	2.5 mL	2.5 mL			
18 to 23	3.75 mL	3.75 mL			
24 to 35	5 mL	5 mL	2 tabletas	1 tableta	
36 to 47		7.5 mL	3 tabletas	1.5 tabletas	
48 to 59		10 mL	4 tabletas	2 tabletas	
60 to 71		12.5 mL	5 tabletas	2.5 tabletas	1 tableta
72 to 95		15 mL	6 tabletas	3 tabletas	1.5 tabletas
96 o más		20 mL	8 tabletas	4 tabletas	2 tabletas

Ibuprofen (Motrin®, Advil®)

Se puede dar cada 6 a 8 horas. No dar más de 4 dosis en 24 horas. **No dar a bebés menores de 6 meses.** Si su hijo pesa 11 libras o menos, hable con su pediatra para que le indique la dosis.

Peso (en libras)	Suspensión líquida para bebés	Suspensión líquida para niños	Tableta masticable suave para niños	Tableta masticable para menores	Dosis regular en tableta para adultos
	50 mg/1.25mL	100 mg/5 mL	50 mg cada una	100 mg cada una	200 mg cada una
12 to 17	1.25 mL				
18 to 23	1.875 mL	3.75 mL			
24 to 35		5 mL	2 tabletas		
36 to 47		7.5 mL	3 tabletas		
48 to 59		10 mL	4 tabletas	2 tabletas	
60 to 71		12.5 mL	5 tabletas	2.5 tabletas	
72 to 95		15 mL	6 tabletas	3 tabletas	
96 ó más			8 tabletas	4 tabletas	2 tabletas

Estas instrucciones son sólo una guía general. Su proveedor de atención médica puede darle instrucciones especiales. Por favor, llame a su proveedor de atención medica si tiene cualquier pregunta o preocupación.