


Control del dolor

682-885-7246

1500 Cooper Street
Fort Worth, Texas 76104

Bloqueo del nervio occipital

El nervio occipital transmite sensibilidad y sensaciones a la parte posterior y superior de la cabeza.



Medical Illustration(s) © 2019 Nucleus Medical Media, Inc.

Cómo ayuda el bloqueo

El esteroide reduce la inflamación y la hinchazón del tejido alrededor de los nervios occipitales. Esto, a su vez, ayuda a disminuir el dolor y otros síntomas provocados por la inflamación.

El bloqueo del nervio occipital puede aliviar los dolores de cabeza que se producen en la parte posterior de la cabeza, como los dolores de cabeza por tensión y las migrañas.

Cómo se realiza el bloqueo

Dura aproximadamente de 15 a 20 minutos.

1. Le limpiamos la piel en la parte posterior de la cabeza para ayudar a disminuir las probabilidades de infección.
2. Inyectamos una pequeña cantidad de anestesia local y un medicamento esteroide en el área del cuero cabelludo alrededor del nervio occipital.

Inmediatamente después de la inyección, sentirá alivio del dolor. Por lo general, este efecto se debe a la anestesia local inyectada y desaparece en algunas horas.

- El esteroide comienza a actuar aproximadamente en 4 a 7 días.
- Puede durar varios días hasta 3 meses.

Lo llamaremos varios días antes del procedimiento.

Le indicaremos lo siguiente:

- Dónde y cuándo debe llegar.
- Cuándo interrumpir las comidas y bebidas.

Medicamentos y alergias:

- Le preguntaremos el nombre y la dosis de todos los medicamentos que recibe su hijo.
- Le preguntaremos si su hijo tiene alguna alergia.

Nota: Es posible que deba dejar de tomar algunos de sus medicamentos antes del procedimiento.

Tenga en cuenta lo siguiente: No debe realizarse este procedimiento si:

1. Tiene alergias a cualquier contraste radiográfico, mariscos, Lasix o a los medicamentos que podemos inyectarle.
2. Recibe medicamentos anticoagulantes, como Coumadin, heparina o Lovenox.
3. Tiene una infección activa.
4. Tiene temperatura superior a 101 grados.
5. Tiene un recuento bajo de plaquetas.

Riesgos

En términos generales, este procedimiento es seguro.

No obstante, al igual que con cualquier procedimiento, existen riesgos, efectos secundarios y la posibilidad de complicaciones.

- Molestia, espasmos en el cuello, hinchazón
- Moretones
- Sangrado en el lugar de la inyección
- Infección
- Reacción alérgica a la anestesia local o al medicamento

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales. Por favor hableles a sus proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.