

Control del Dolor

Teléfono: 682-885-7246

1500 Cooper St.
Fort Worth, TX 76104

¿Qué es Valium?

Valium es un tipo de medicamento llamado *benzodiacepina*. Es un medicamento contra la ansiedad. También usamos Valium como sedante. Usamos Valium para tratar:

- Ansiedad o nerviosismo
- Convulsiones
- Espasmos musculares

Valium puede ayudar a su hijo a relajarse y calmarse antes de un procedimiento.

Antes de ordenar Valium, necesitamos saber:

1. Los problemas de salud de su hijo, especialmente problemas con:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Glaucoma | <input type="checkbox"/> Problemas respiratorios |
| <input type="checkbox"/> Miastenia grave | <input type="checkbox"/> Síndrome de apnea del sueño |
| <input type="checkbox"/> Depresión | <input type="checkbox"/> Embarazo |
| <input type="checkbox"/> Convulsiones | <input type="checkbox"/> Lactancia |
| <input type="checkbox"/> Problemas de hígado | |

2. Medicamentos actuales

Por favor, traiga todos los medicamentos caseros de su hijo al hospital.

Por favor, incluya todos:

- Los medicamentos recetados y los que toma 'según sea necesario'.
- Los medicamentos, vitaminas, suplementos, hierbas de venta libre (sin receta) y remedios caseros.
- Los inhaladores, tratamientos respiratorios, gotas para los ojos, gotas para los oídos o cremas o lociones medicadas.

3. Mencione las alergias conocidas de su hijo

Por favor, díganos si su hijo ha tenido algún tipo de reacción a otros sedantes, medicamentos para dormir, analgésicos, etc.

Dar Valium

1. Nunca adivine sobre los medicamentos

Si no entiende o no está seguro de qué hacer, háblenos o hable con su farmacéutico.

2. Dar la dosis correcta a la hora correcta

El doctor de su hijo le indicará la dosis de Valium que debe dar y cuándo darla. No le dé a su hijo una dosis diferente o a una hora diferente.

3. Pastillas o líquido

Dígale a su doctor si su hijo puede tragar pastillas.

Para medicamento líquido: Siempre use una copita dosificadora, cuchara dosificadora o jeringa dosificadora.

4. Comida

Su hijo puede tomar este medicamento con o sin alimentos. Tomar Valium con leche puede ayudar a prevenir un malestar estomacal.

5. Solo 1 dosis ordenada

Solo tendrá 1 dosis de Valium. Tenga cuidado de no derramarla ni perderla.

El Valium de mi hijo

	Líquido	Pastilla
Dosis que dar:		
Hora para dar:		

Notas:

Almacenamiento de Valium

Mantenga todos los medicamentos alejados de los niños.

Nunca comparta el medicamento de su hijo con nadie.

Mantenga la dosis de Valium en un recipiente cerrado a temperatura ambiente, lejos del calor, la humedad y la luz directa.

Posibles efectos secundarios de Valium

- Sentirse aturdido o mareado
- Somnolencia o cansancio
- Boca seca
- Dolor de estómago
- Diarrea

Posibles efectos secundarios

Háblele a su doctor o al 911 *inmediatamente* si su hijo tiene alguno de estos efectos secundarios:

Reacción alérgica

- Comezón
- Erupción cutánea o urticaria
- Hinchazón en la cara o las manos
- Dificultad para respirar
- Hinchazón u hormigueo en la boca o la garganta
- Opresión en el pecho



cookchildrens.org

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales. Por favor hábleles a sus proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación.

Un proveedor de atención médica me hablo sobre la información en este folleto.

- Sé lo que necesito hacer.
- Sé por qué hacer esto es importante.
- Todas mis preguntas han sido respondidas.
- Tengo una copia de este folleto.

Nombre del paciente

Paciente, Padre, Madre, o Representante Legalmente Autorizado

Nombre en letra molde

Su parentesco al paciente

Fecha

Firma

Hora a.m. / p.m.

For staff use only

Valium

Healthcare Provider

MRN (Medical Record Number)

Printed Name

Signed Name

Date

Time a.m. / p.m.

Interpreter

Printed Name

Signed Name

Interpreter Number

Date

Time a.m. / p.m.

Print or imprint Patient Information

MRN _____

CSN _____